



Avertissements[®] agricoles Auvergne & Limousin

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 2 Juillet 1987

n°12

MAIS - Pyrale : où traiter en 1987 ?
TOURNESOL - Pucerons : Ils sont en régression

MAIS

Stade : 40 à 80 cm de hauteur

PYRALE

★ Où traiter cette année ?

+ Dans l'ALLIER :

La carte ci-après réalisée à partir d'une enquête effectuée à l'automne 1986 vous précise les secteurs à traiter : principalement entre GANNAT et SAINT-POURÇAIN-s/SIOULE.

+ Dans le PUY-DE-DOME :

- Maïs semence : toute la Limagne
- Maïs grain : c'est surtout en Limagne Nord (secteurs compris entre ENNEZAT et EFFIAT) que le risque est le plus important.

★ Situation

- Cage d'élevage de MARMILHAT : lère chrysalide le 15/06
lers papillons le 29/06
- Pièges sexuels : Aucune capture à ce jour.

★ Préconisation

bulletin.

Pour intervenir avec un granulé, attendre un prochain

TOURNESOL

(Inflorescence de 2 à 4 cm de diamètre - E2
Stades) à
(Boutons avec le centre vert - E3

P...1.19

PUCERONS

★ Situation

Une régression des populations est constatée.

★ Préconisation

Aucune intervention ne doit être effectuée.

BETTERAVE SUCRIERE

MALADIES

- En culture des taches sont notées sur le feuillage.
Il s'agit de la Bactériose.

- ✎ - La fiche couleur jointe vous précise les différents symptômes des maladies du feuillage.



ALLIER - Pyrale : Zones à traiter en hachurée.